

**DE HAEMATURIA
DISSERTATIO
PATHOLOGICO-
THERAPEUTICA
QUAM...**

Gaetano Faini, Ferdinando De
Cattanei di Momo



1
52

DE HAEMATURIA

Quaestio Pathologico-Chirurgica

QUE

CONSENSU ET AUCTORITATE

PRÆLUST. DIRECTORIS AC PRÆCISUS FACULT. MEDICÆ,

SPECTABILIS D. DECAPI,

RECTORIS CLASSEMEDICINÆ D. D. PROFESSORUM

ET DOCTORIS MEDICINÆ LAUREUM CONSEQUUTUS

IN G. R. UNIVERSITATE TICIENSIS

JURISCE

D. FERDINANDO MOR. DE CATTANEI, ET MOMO

PRÆCISUS P. O.

UNA CUM THESES DEFENDENDAM

publicæ Disquisitioni offerbat

FABRIZIO CATTANEO

EX ROMA



TICINI REGII

Et Typographia Regia

1847.

Per C. Cattaneo



PRAEFATIO.

Pro inaugurali tentamine de *Macnataria* discerendum suscepì, quæ morbum sistit infrequentem quidem, nam celeberrimus Iohannes Petrus Frank sex tantummodo casus observasse testatur intra 4000 segros in Instituto Clinico Tirolensi decemni spatio collectos, unum solummodo inter 1913 in Instituto Clinico Windobonensi curatos, namque solum rita hoc morbo functum in eodem nosocomio inter 13647 segros, verum gravem admodum, et curam difficillimam, et sæpe sæpius flere plenissimam. Hæc itaque circumstantiæ non inutile fore mihi visæ sunt quæcumque in auctorum præstantiorum operibus de ipso morbo diffusa invenirentur, in unum colligere et publici juris facere, cœnulis parvis propriis emendationibus adiungendo. Me non laetet parva a me expectanda esse; optimo tamen voluntatis animi benigne indulgeat lector, virumque defectum parcat: feci quod potui, faciat meliores potentia.

Morb. definitio, synonymia, divisiones.

Haematuria, *haemipol*, a graecis vocibus *haima*, crux et *haima*, sanguis originem ducit, profusius sanguineum constituit ab organo urinario prodroma. *Affectus sanguinei*, *mixtus cruentus* nomine passim ab auctoribus insignitur; *haemorrhagia ex viâ urinaris* ab Hoffmanno nuncupatur; *crux si sanguis*, *pisio sanguineus* apud Italos, apud Gallos *piacement de sang. suint*. Quaecunque autem harum denominationum adhibeatur, nos pro haematuria intelligimus = vel sanguinis sincerum, plerumque liquidum, interdum grumosum, polyposum, vel urinae cum = cruentis, nunc pauci, nunc multi, nunc pellucida, et pulchre rubentis, nunc obscuri, = substri, annosi, nunc fore coacti, portiones = remittens ex propriis receptaculis profusius (1) =.

Sanguis autem qui ab urinaria viâ cum, vel sine urina excoquitur, ex diversis officinae uropoëticae partibus originem ducere quærit, a renibus, videlicet, ab uretheribus, nec non a vesica. Exinde prima scaturit hujusce hæ-

(1) *J. P. Frank Epit. de cur. haem. morb.*
t. 6. p. 221.

hemorrhagiae distinctio, in *venales* nempe, *arteriales*, et *cyrticas* seu *veniculas*. Cetero-
rum porro ad lusus morborum vel a causa
in organa oropoejica primas agente profuit
mictas cruentas, et *hydropathicas* sive *proto-*
pathicas est; vel ab alio eum visuum ad-
lectione procedit, et *symptomatice* sive *deuto-*
pathice, vel quidem *sympathice* haematuria
habetur. *Protopathica* locale quoque
autocipiter, *symptomatice* *secundaria* dici-
tur. Accedit interdum ut, sanguinis profluvio
per urinarias vias contingente, morbi non-
nulli, qui alio eum attingerent gradum, vel in
melius abeant, vel perfectam etiam solutionem
consequantur, talique ratione critica haematuria
erudit. Nec desunt exempla, in quibus ad de-
terminatas periodos revertere consuevit, *pe-*
riodice haematuriae praebens. Modo praeter-
ea incedit hic morbus cum adueto partium,
in quibus obinet, vitæ excitemento, modo
sub opposita conditione evolvitur; talique ra-
tione mictas cruentas, doctore perillustri Ba-
yer, vel *activas* est, vel *passivas*, vel, ut ver-
bis utar praedictissimi I. P. Frank *urgicae*
vel *afynonicae*.

Hae sunt potissimae morbi, de quo disse-
rimus, divisiones. Causae autem unde proce-
dere possent, perspicuas, clarissimae Sava-

genus plures atque plures admittit illius species, quae ad sequentes reduci queant:

1. *Haematuria spontanea*: a sanguinis in renibus congestione procedens, utplurimum, rari modum excedit, salutaria. Ad hanc pertinent mictus cruentus verruciformis Winsleri, lambricorum mictus Pisteri, mictus cruentus mercurialis Brasavoli, mictus cruentus duplex seu spontaneus Jankei.

2. *Haematuria valente* — e vomitu, equitatione, ictibus, lapsu etc.

3. *Haematuria deceptiva* — Morbus qui sub hac specie recensetur non est vera haematuria, nam urinae sanguine minime scintillant, tantumque plus minus rubrum colorem referunt. Producitur, sectoris ad mentem, ex fictis epuribus seu.

4. *Haematuria parulenta* — Nonnulli ab parulis cum sanguine mixtionem ab aliis differt.

5. *Haematuria calculosa*, quae, sinistrum, calculorum in organo urinae latitantium soboles est.

6. *Haematuria in morbis exanthematicis coarctata, varicelosa, scarlatina, morbillata* etc. mali semper omnia e Sydenhami sententia.

7. *Haematuria quoaditoria*, quae sanguinis pro simul sub coitu evacuatione efficitur, a vera haematuria longe different.

8. *Hæmaturia ciliata* in qua sanguis genitalis ab urethra effluit ; quod sufficit ad eam a vera hæmaturia discriminandam.

9. *Hæmaturia hæmorrhoidalis* sive mictus cruentus ex hæmorrhoidibus vesicas Jussari.

10. *Hæmaturia spuria* non a mictu sanguineo sed colore urinaeum rubro tantum constituta. Hujus sub-species esset *Hæmaturia leucæmia*.

11. *Hæmaturia nigra*, ex atro sanguine, qui cum urina emittitur, colore.

12. *Hæmaturia catamenialis*, quæ quavis mense contingens, menstruum viciis gerit.

13. *Hæmaturia a transfusione* a Denis in viginti diebus de quinquaginta, quæ periculo subiecit, sanguinis transfusione tentata, observata. Maréchal, qui similem operationem passus erat, idem phænomenon exhibuit.

14. *Hæmaturia traumatica*, ab externis causis violenter agentibus genita.

15. *Hæmaturia a vermibus*, cujus non desunt apud auctores exempla.

Morbi Hypothipost.

Quæ mictum cruentum præcedunt aut concomitantur symptomata, multimode variant pro ædib, unde sanguineum profluvium venit

8

diversitate, nec non pro causarum, quae morbum genere, varietate, pro complicationibus etc. Sic quidem vera haematuria haud infrequenter, quin ullus precedat prodromus, in conspectum prodit; alias vero ponderis et tensionis in hypogastrio vel in renali regione sensus, calor et ardor hiace in partibus, frequentes ad mingendum visus, cum urinas ejiciendi difficultate, ejusdem adpurificationem antecedant. Renalis pathesimum haematuria, si ab externa provenit causa, quin dolor eam comitetur, in scenam venit: est haec eadem sanguinis mictio atrocibus interdum doloribus conjungitur, si calculi in renibus latitantis festulo sordes sit. Non tamen desiderantur exempla vehementis hujus doloris renum regionem torquentis, licet ab alia causa morbus procedat, historiamque tradit celeberrimus J. P. Frank feminae cujusdam, quae in hunc morbum ex recentis catamenii offenderat, quaeque intollerabili ad renes cruciata angabatur. Hiace porro adduntur calor et ardoris sensus non modo in praefata renali regione, verum juxta uretherum decursum ad vesicam urinariam usque; adeat corporis languor, sporadica testium retractio, coarctum torpor, abdominis calor et tumefactio, alvi constipatio, aliaeque hujusce generis. Ad ure-

lirum quoque et perinœum, extenditur dolor vesicæ versus si hæc utpote morbi sedes sit criminanda, et sæpenumero permolestus associetur priapismus. Dolent præterea lumbi, anxietas præcæ est, respirandi difficultas, nausea, vomitusque oriuntur, febris supervenit, frequentes arteriæ micatus edunt, contractæque tactu percipiuntur, mingendique vires creberrimæ adhuc sunt, permolesti, partus quasi dolores sæpe vixi, ut verbis utar perillustri Johannis Petri Frank, ac insensibili, viros præsertim, cruciatis vexantes (1). Quod si sanguinis profluvium copiam jam excedat, immodicæque evadat, alia atque alia, acuti in cunctis profusioribus hæmorrhagiis contingit, observanda erunt. Hinc extremitatum frigus, cutis pallor cum frigidis sudoribus, animi deliquio, virium prostratio, pulsus parvus et similia in conspectum se præbent.

Sanguis autem qui cum urina emittitur in diversis casibus variare solet tum ratione quantitatis, tum modo quo mingitur, denique ob physica, quibus instruitur charactera. Modo enim parva quantitate effluit, ad ingentem modo copiam extravagatur, quemadmodum equiti a preclarissimo Van-Swieten me-

(1) *Épît. de cur. hom. morb.* 1. 6. p. 218.

moesta occidit, qui, haematuria ob diu protractam equitationem dorepente correptus, octo sanguinis libras paucis horis suavit. Porro verus colorque interdum, initio praesertim, emittitur viscosus, nonnunquam parva quantitate urina miscetur, illisque aquae pro pedis resectione adhibitas adpectum consolidat; aliquando siger aterque est, atque in grumos cohitur, qui magno serpentinum cum labore ab urethra ejiciuntur, diversaque praebent formam, concretionibus polyposis similes, haud raro longi et tubulosi, vernisive figuram plus minus perfecte emulantes; ex quo factum est ut pluries, deestibus praestantissimis Raimann et Haige Delorme, pro verrucis resapse ab minus attentis haberi fuerint. Verruiformes istiusmodi concretiones nonnisi aliquot linearem longitudinem, calamique scriptorii magnitudinem generatim attingunt; nihilominus acius, quamvis per raro id eveniat, ingentem extensioem alias assequuntur. Qua de re hic praetereundum non esse videtur exemplum a celeberrimo Boyer memoratum, quodque nos ipsis auctoris verbis hic referendum esse ostendit: « Un uomo di cinquanta anni, coscienziosissimo e Amsterdam, molto sanguigno e un poco melanconico, avendo avuto una cuspigia, da cui uscì beatissi-

« mo ristabilito , soggetto da molti anni alla
 « renella , e che ne aveva in una volta resa
 « un' oncia , fu tutto a un tratto assalito da
 « una ritenzione d' orina dopo un violento
 « esercizio di corpo. In capo a poco tempo,
 « e dopo vivi dolori nell' uretra , uscì da que-
 « sto canale un corpo nastro della grossezza
 « di una penna d' oca , e della figura di un
 « vermic. Questo corpo , lungo venti pollici ,
 « essendo stato estratto pian piano , uscì del-
 « l' orina mescolata con molto sangue. Un
 « quarto d' ora dopo ne uscì un altro della
 « lunghezza di un' oncia. Dopo questo tem-
 « po , per quattro giorni e quattro notti ,
 « uscirono ogni mezz' ora dei simili corpi ,
 « diseguali in lunghezza, il più lungo dei quali
 « era di dodici onze. Egli era molto bruno ,
 « e diventava più vivo di colore quando era
 « esposto all' aria ; la sua superficie ripren-
 « deva allora per gradazioni successive il suo
 « colore naturale , e lo conservava di poi
 « tenuto nello spirito di vino ; di più questo
 « sangue vi acquistava una grande densità.
 « Questo era visibilmente ateguo a ciò l' ure-
 « tra avea servito di trafillo (1). — Simi-
 lem haec caeco observavit praedictus Swie-

(1) *Entis. chirurg. t. 4. p. 442.*

tenia, sed hujusmodi concretio polyposa pedis longitudinem non exsuperabat.

Nequaquam angularem cum materiis viscidis, foetentibus, mucosis, puriformibus, nec non arenulis repletam externis moriendum est. Pariterque silensio non est praetercundum interdum contingere quod praefata grana in urethra ductum introducantur, atque exinde ob similem molem rescuari nequeant, talique ratione et urinarum exitus insuperabilem possint obicem. Si hoc evenit, plura inde enascuntur mala: non modo enim urinaria cystis irritatur et ad inflammationis statum perducitur, verum etiam omnis pernicietate ischuriae phaenomena praesto sunt.

Aetiology.

Nunc tali modo exaratis, in causas, quae mictum cruentum producendo sunt perae, nobis tunc temporis breviter inquirendum officium est. Atque hic omnino primo commemorare oportet causas, quae hanc materiam gignere valent, multiplices admodum esse, et in externas atque internas, nec non in dispositivas et occasionales recte distinguendas.

Sexus potior, aetas adulta vel senilis, robustior corporis constitutio, temperamentum

sanguineum, victus lautior, vita segnes dispositiones in hæmaturiam largiuntur. Frequentius porro in eam incident perennes calculi renali, aut vesicali laborantes, neq non arthritidi et podagras proclives. Quicumque organorum uropellicorum progressum morbus, potissimum vero cystitis et nephritis ad altiorum erectas gradus proferri, de quo disceimus, in causis fieri queant. Singulis copis aut acrimoniæ pecunie, scorbutici ejus dissolutio, ejusdem in pluribus febribus male indolis colligatio utpote eundem effectum progignendo parva a præstantissimo Vaghe criminantur. Maximamque ad eam producendam habitualium secretionum, membrorum potissimum, hæmorrhoidumque suppressionem symbolam conferre omnes testantur medicinas scriptores. Ulcera et erosio vesicæ, ejusdem vicaria fungus, sclerbus, cancer, varices, vulnera, eodem in casso memoranda veniunt. Neque prætereunda est in calidioribus locis habitatio, quæ de causa hæmaturiam in militibus Gallis Aegyptum potentibus observasse tradit Bésault. Fluvis in insensibilibus mictum sanguineum ex fasciâ arboribus observasse testatur, celeberrimus Boerhaavius, qui striciores testes ad adulterum hæmaturiam producendam conferre prout

docet. At nihil in hujusmodi morbi productione, majorem, praestantissimo Hoffmanno monente, spartam sibi vindicat quam violentior motus et equitatio, qua de re sequentiâ exponit perillustria Hollerius : « Sunt cornuuli, qui si de-
« ritus equitant aut se se exercent hujusmodi-
« ritus, ex calefactis rebus sanguinem me-
« rant (1) ». Et Riverius homines quinquaginta annos nati mentionem habet, qui quibus equitationi indulgebant, mictum cruentum experiebatur (2). Praelaudatus Hoffmannus ex vertebrae sublatione aeterni, et semel ex ubi fractura haematuriam etiam observasse testatur (3), nec actum amputationibus alienam esse omnes in unum consentiunt. Totus porro lumborum regio, hypogastrium, et perineo illati, nimis ad ponderosiores corpora elevanda, partus conatus, vomitus violentos aliaque similia inter haematuriae causas recensenda quoque sunt. Remediorum quo in diuretica aut emmenagoga virtute pollere feruntur, si ex scrierum classe deprimantur, utae, ejusdem generis purgantia, cantharides, cornuulorum ad mentem, externe etiam adphi-

(1) *In aphor. Hippocr.* 78. sect. 18.

(2) *Cent. 2. obs.* 36.

(3) *Med. nat. system.* t. 4. p. 11. p. 70.

citas, terminis ventris, aliam corpore magna quantitate ossem, gestatio, animi excandescens, aliisque plura eandem morbum portendere valent. Post commotionem, dum curis rehebatur, perperam in hæmaturiam per animum antonia cum cruciatibus duratorem effudit periblastis Hahnii. Prælaudatus Frank juvenis historiam refert, qui hæmaturia correptus, ex eo quod balneum parvianum a complicitate chocolate, ledendi causa, immisum, Ex repulsa acerbis actum sanguinetum hoc profluvium vidit Hoffmannus, qui illud effluens, tam venereum, liquorumque alcoholicorum abusum consequi præcipit. At denique obliuiscendum non est a remissis etiam in urbis, his viis latitantibus hæmorrhagiam, de qua sermonem habemus, præsertim ponit, quomodo testator Vogelius, et a Trilleri, Bianchi, Boneti, Maugeti, et Pallas observationibus comprobatur.

Merçi Dénudée.

« Magnitudo periodi in hoc morbo, in-
 « quit præclarissimus Borserus (1), ex sen-
 « sibus effusi copia, ex continuatione aut re-

(1) *Iust. med. pract.* t. 4. p. 444.

« curia, ex symptomatibus aut morbis conju-
 « ctis, ac denique ex partu affectus ratione
 « aestimatur. » Quae quum ita sint, in haematuriae prognosi pronuntianda ad haec omnia
 momenta attendendum erit. Quapropter quo-
 tisqueque sanguis, qui cum urinis mingitur,
 parva erit quantitas, atque ex causa levidensi
 aut facili negotio amovenda processerit, fau-
 stum morbi exitum attendere licet. Minor
 e contrario erit aevationis spes si oppositae
 in praesentia habeantur circumstantiae, vel si
 sanguinis profluvium, licet parva quantitate
 constitutum, frequenter redeat, aut pejor si
 lucubenter continuat. Symptomata morbum
 concomitantia suam quoque alia vindicant
 symbolum ad haematuriae prognosin rite pro-
 ferendam; hocque sub adspiciu melius varia-
 tu facilius erit si lenioribus symptomatibus
 comitetur, et a contrario. Si protopathica sit
 morbus, simplex, nullamque aliam morbosam
 affectionem comitem habeat, facilius reco-
 valescet quam si aliorum organorum affectio-
 nibus complicitur.

Verum de haematuriae divinationis locatari
 silentio praeterire non possumus nonnam-
 quam illam fausto quidem omine, cum egro-
 rum nempe emolumento obvenire. « Qui a ple-
 « tha inde indicat fluxum sanguinis per urinas,

« inquit Riverius (1), non semper morbosus
 « est, aut symptomaticus: sed interdum con-
 « tingit bonis aegri rebus, natura onus super-
 « fluum per illas vias deponente, sicut refert
 « Arethaeus, nonnullas per quendam circuitus
 « sanguinem mittere, atque circuitu cessante,
 « capitis dolores, oculorum caligines et verti-
 « gines excitari». Atque hujusmodi salutaris,
 ut ita dicam, haematuriae plures ab auctori-
 bus observationes referuntur, et potissimum
 ab Hoffmanno, qui ait: « Vidimus nos talem
 « criticam actionem liberatorem in viris,
 « sanguine abundantibus, aëre plethoricis, vi-
 « ribus vel etiam senilibus aetate, oppressis, vel
 « etiam penitus cessante haemorrhoidali fluxu,
 « aut contracta omnia sanguinis missione, pe-
 « riculi tamen prorsus expertem. Vidimus quo-
 « que in foemina octogenaria regalis, et
 « laete adhuc viventibus, praesertim si, cea-
 « santibus menses, sanguinis missio vel fur-
 « rei neglecta, aut plane omissa(2)».

Retinendum tamen non est hoc quoque
 criticum sanguinis per urinarias vias proflu-
 vare periculo non semper vacare, si cuiusd
 sanguinis copia excedat, vel pluries et fre-

(1) *Op. med. acc.* p. 325.

(2) *Med. syst. rat. t. IV. p. II. p. 68.*

quenter nigis recurret. Quamobrem recte admonet prelaudatus Hoffmannus: «Omnis vero « cruentus mictus est periculi non expertus ».

Quia tamen criticus sit hæmaturia, quavis ætæper medici attentionem mereatur, minus periculi portendere quæ si aliæque febri et doloribus incedat, æque in urinaria vesica sedem habet. Plus æ contra discrimina affert quæ in externis violentiis causam agnoscit, quæ æ renum affectione provenit, quæ materiam purulentam cum sanguine fundit. A venibus cæta, hæc æ vesica extensa manatur. Idem de illa quæ æ calculis fit, repetere docet. Alio plenissima est quæ æ renum vel vesicæ ulcerationibus subornatur. « Copiosa vel frequens sanguinis per urinas « excrectio valde periculosa, inquit Bæverius (1), potest enim in tabem et hædrem « perni ægrotañtem conducere ».

Quæ in febribus, sic dictis, putridis, in variolis, in morbillis contingit, periculosissima esse consuevit. Si in variolis, maculis lividis in cute apparentibus, hæmaturia supervenit, de ægro, testæ Sauvageo, actum est. Sicubi pessimi omnis indicium in peste Nimægeni hæmaturiam observavit Dierembroekius. Si in

(1) Op. cit. p. 327.

vesica colligitur sanguis, res periculi plenissima est.

Hæmaturia Therapia.

Sanguinis missione nihil tutius et proutabilius esse in multis crescenti curations fert jam pluries laudatâ Hoffmanni sententiâ, et hoc resque princeps sistit auxilium in hoc morbo generatim adhibendum. Sanguinis autem educendi quantitas pro circumstantiarum diversitate variare debet, atque segrotantis ætati, constitutioni, sexui, temperamento, morbi gradui etc. adaptari. Idem audere oportet relate ad ipsius repetendæ convenientiam. Præter venæsectionem autem hujus morbi curationi maxime prodesse solent cucurbitulæ profundius incisæ, lumbis aut abdomini admotæ, nec non hydragmæ adplicatiæ ad hypogastrium, ad perineum, et, ubi suppressæ hæmorrhoidalis fluxus morbi in causâ sit, præcipuis ad vasa hæmorrhoidalia quo in casu et saphenum secare convenit.

Post sanguinis evacuationes purgantis leniora, et regio potissimum vegetabilis-deprompta, quæmaxime contra hæmaturiam esse valent, quæmodocumque etiam potus aciduli et refrigerantes, nec non clystera emollientia

frequentius injecta, similisq; fomentationes abdomini vel perineo impositae, et balnea universalia tepidula. Quod si nihilominus secus prodursum continuet, et aegrotantis vires jam languere incipient, sive ob effusi sanguinis capiam, sive ob morbi diuturnitatem, tunc frigida fomenta, nec non ipsam glaciem abdomini, lumbis, perineo, et superiori coxae plagae superimponere oportebit, frigidi ex aqua gelida et aceto clysteres erunt infundendi, frigidaeque atque adstringentes in vesicam injectiones peragendae. Monendum tamen est, novitiam magna cum caecula hujusmodi annulis uterpanda esse; perari enim, Raige-Delorme docente, sunt caesa, in quibus ipsis uti necesse est.

Si autem jam adoleverit morbus, et frequenter sit recidivus, vel in rheumaticum decursum nitatur, aegrotique vires labefactari videntur, tunc haemorrhagia urinaria colubenda erit, ad quam assequendam scopum plura atque plura passim evadentur. Emplastrum ex ranarum spermate, alumini, saturni saccharo, camphoraeque composito, et lumbi regionem adjunctum, nec non epithema ex ovorum albumine cum albusine subacto, pulvisque frigidum impositum ab Hoffmanno laudibus extolluntur. Clystera iterum de alumine, vel *singe anti-*

trui, vel de aqua acido sulphurico acidulata, vel aqua vulneraria romana, aut urticarum succo vel decocto composita a Monteggia commendantur. Radix terrestris, gummi-kino, sanguis draconis equidem proponantur. Infusum florum arnicæ, ubi morbus ab ista vel contusione prodit, maxime conferre dicitur. Succus plantaginis, decoctum centinodiae, portulacae, similitatem rubi, addito granatorum vel cydoniorum succo, consullis probantur. Pulveres Doveri, digitalis, cortex peruvianus, vinum Nilmanni antiscorbuticum, aliquæ ejusdem generis apta ratione suppeditata maxime, subjectis praesertim scorbutis laborantibus, suppeditas offerre queant.

Diximus superius, anginam in vesica effusam in grumos coire posse, atque hoc de causa cystitis magis magisque irritare, novemque penere morbi causam, vel in urethram compelli, et pergravam ischuriam gignere. Si hoc, infuusto quidem omni, contingat, magnum in vesicam immittendus est catheter, ex quo anguis una cum urina fluere queat. Quod si hoc minus succedat, injectiones aquae tepidae sunt peragendae, ut sanguis effusus diluatur, solvatur, illiusque exitus facilius evadat. Verum neque hoc semper ad scopum atsequendum sat est; quandoque enim urget

necessitas siphonem in urethram inserti, et sanguinem per ipsam, affuso aere, educere.

Hæc exposita, superest ut quid relate ad regimen dieteticum sit necessarium, tradamus. Hinc admodum maxime omnium prima animi et corporis quietem servandam esse, alimentis parvis, parum nutrientibus, facile digerendis utendum, potibus emollientibus, refrigerantibus indulgendum. Quibus omnibus denique addere oportet, lactis maximeque ovilli usum magni momenti in hujus morbi curatione esse, ex quo uno auxilio et holo armato plures sanitates obtinisse testatur Gallienus, Hæbæus, Duresus, et Forestus, qui obs. 13 l. 4 inquit: Saepe sanguinis siccum solo lacte ovilli, nampe administrando uncias quatuor lactis, et drachmam unam holi armati veri curavi.

FINIS.

THESES DEFENDENDÆ.

I.

Morbos nonnullos ad longevitatem conferre.

II.

Inflammationem æstheticam non dari.

III.

Malices menstruales carentes non semper steriles.

IV.

Emmenagogi contrariam illi ad quem suscipiendum præscribuntur, effectum sæpe agere.

V.

Lechiorum retentionis causam non semper in utero latere.

VI.

Cum sanguinis detractio sanguinis fluxus sæpe coarctetur,

VII.

Uterus aromaticorum et spirituosorum apud plebem vulgarem, in enteralgia acipianne necesse.